

Please Note

There is a newer version of this document available at:

RelianceOrthodontics.com/ifu

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

Reliance Orthodontic Products, Inc. 1540 W. Thorndale Avenue, Itasca, IL 60143 USA

1-800-323-4348 | Made in USA | Rx Only

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

Когато свързвате в области с голямо напрежение или свързвате приставки (горни вторични молари; екструдиране на засегнати кучешки зъби), почиствае зъба с First and Final®. Извършете едване с киселина на емайла за 30 секунди. Изплакнете и подсушете. Нанесете 1 слой Assure® Plus, подсушете с въздух и оставете леко да се втвърди. Смесете и нанесете Precedent® върху скобата или бутона и поставете върху зъба. Натиснете на място и почиствае изпишното количество. Изчакайте 15 минути, преди да поставите активна арка.

⚡ **ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:** Неполимеризираните смоли може да причинят кожни усещания при чувствителни лица. В случай на контакт с кожата измийте обилно със сапун и вода. При случайнo попадане в очите промийте обилно с вода и незабавно потърсете медицинска помощ. Контакт с други тъкани: незабавно изплакнете мястото на разлив с обилно количество вода в продължение на няколко минути.

⚡ **Корозивно**

⚡ **ТЕМПЕРАТУРНО ОГРАНИЧЕНИЕ:** Да се съхранява в хладилник (2-8°C)

ГАРАНЦИЯ: Reliance Orthodontic Products, Inc. признава своята отговорност да замени продуктите, ако се докаже, че са дефектни. Reliance Orthodontic Products, Inc. не поема отговорност за всякакви вреди или загуби, преки или последващи, произтичащи от употребата или невъзможността за употреба на продуктите така, както е описано. Пребри употреба потребителят трябва да определи пригодността на продукта за неговата предназначена употреба. Потребителят поема целия риск и отговорност във връзка с горното.

⚡ **САМО ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДИПИСАНИЕ:**

Федералният закон на САЩ ограничава продажбата на това изделие само от или по поръчка на лекар-специалист по дентална медицина.

ЗАБЕЛЕЖКА: Докладвайте на Reliance всякакви сериозни инциденти, както и на компетентните институции в държавата, където потребителят и/или пациентът живеят.

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

nepřijímá odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty, přímé nebo následné, vyplývající z použití nebo nemožnosti použít produkty, jak je popsáno. Před použitím je uživatel zodpovědný za určení vhodnosti produktu pro zamýšlené použití. Uživatel přebírá veškerá rizika a odpovědnost v souvislosti s tím.

POUZE NA LÉKARSKÝ PŘEDPIS: USA Federální zákon omezuje prodej tohoto zařízení z titulu objednávky zubního lékaře nebo na jejím základě.

POZNÁMKA: Oznamte společnosti Reliance a příslušnému orgánu státu, ve kterém užíváte/a nebo pacient sídlí, jakoukoli závažnou událost.

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

Band einpassen. Überschüssige Grate sofort mit einer nassen Watterolle säubern. Die Arbeitszeit ab Mischbeginn beträgt 2,5 Minuten. Nach 5 ½ Minuten können das Dry-Field-System und die Vangenhalter entfernt werden. Vor der Ligatur weitere 5 Minuten warten.

KLEBEN VON BRACKETS:

Bei der Befänderung in stark beanspruchten Bereichen oder bei der Klebung von Attachments (Auftrichen der zweiten Molaren; Extrudieren impaktierter Eckzähne) ist der Zahn mit First and Final® zu reinigen. Konditionierung des Zahnschmelzes über 30 Sekunden. Spülung und Trocknung. 1 Schicht Assure® Plus auftragen, mit Luft vertreiben und mit Licht aushärten. Precedent® auf das Bracket oder den Knopf auftragen und auf den Zahn platzieren. Andrücken und Grate säubern. 15 Minuten warten, bevor ein aktiver Bogen platziert wird.

⚡ **VORSICHTSMÄSSIGHEITEN:** Unpolymerisierte Harze können bei empfindlichen Personen eine Hautempfindung hervorrufen. Bei Berührung mit der Haut gründlich mit Wasser und Seife waschen. Das Auge bei versehentlichem Einträufeln mit reichlich Wasser ausspülen und sofort einen Arzt aufsuchen. Kontakt mit anderem Gewebe: Betroffenen Bereich sofort mehrere Minuten lang mit reichlich Wasser ausspülen.

⚡ **Atzend**

⚡ **TEMPERATURBEGRENZUNG:** Gekühlt lagern (2-8°C)

GARANTIE: Reliance Orthodontic Products, Inc. nimmt seine Verantwortung ernst und ersetzt defekte, die nachweislich defekt sind. Reliance Orthodontic Products, Inc. übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Produkte resultieren bzw. aus dem Unvermögen, diese gemäß der Beschreibung anzuwenden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, vor dem Gebrauch des Produkts dessen Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Der Benutzer übernimmt das gesamte Risiko und die damit zusammenhängende Haftung.

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIG: Nach dem US-amerikanischen Bundesgesetz darf dieses Produkt nur durch einen Zahnarzt oder auf Anordnung eines Zahnarztes abgegeben werden.

HINWEIS: Melden Sie jeden schwerwiegenden Vorfall an Reliance und die zuständige Behörde des (Bundes-)Staates, in dem der Benutzer bzw. der Patient niedergelassen ist.

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

RelianceOrthodontics.com

sont installés.

HR - CROATIAN

INDIKACIJE ZA UPOTREBU:

Prizvod Precedent® Koristi se kao ortodontski cement za prstenove.

UPUTE ZA UPOTREBU:

CEMENTIRANJE PRSTENOVA:

1. Profilirajte površinu zuba pomoću proizvođača First and Final. Isperite i osušite.

2. Za svaki prsten postavite dvije ravno pune lopatice praha Precedent® na podlozi za miješanje.

3. Na podlogu, pored praha Precedent® stavite 4 kapi tekućine Precedent ®.

4. Miješajte prah Precedent ® i tekućinu Precedent ® 15 sekundi ili dok smjesa ne postane jednolična i kremasta. Stavite izmiješani cement na unutarnju stranu prstena i postavite prsten. Istisnite višak smjese. Zatim očistite mokrom vatom. Vrijeme rada od početka miješanja je 2,5 minute. Nakon 5 minuta, suho polje retraktori za obraz mogu se ukloniti. Pričekajte dodatnih 5 minuta prije ligature

VEZIVANJE BRAVICA:

Prilikom vezivanja u područjima sa visokim stresom ili prilikom vezivanja dodataka (gornji drugi kutnjaci; istiskivanje impaktiranih ocnjaka), profilirajte zub pomoću proizvođača First and Final®. Provodite jetkanje kasiline kiselinom u trajanju od 30 sekundi. Isperite i osušite. Nanesite 1 sloj proizvođača Assure® Plus, osušite zrakom i tretirajte svjetlom za učvršćivanje. Pomiješajte i nanesite proizvod Precedent® na zub. Prilivite ili gumb i stavite na zub. Brivitišnite i očistite istisnuti višak. Pričekajte 15 minuta prije postavljanja aktivnog žičanog luka.

⚡️ **MJERE OPREZA:** Nopolimerizirane smole mogu kod osjetljivih osoba izazvati reakcije na koži. U slučaju dodira s kožom, temeljito je operite sapunom i vodom. Ako slučajno dospiju u oči, isperite obilnom kolicinom vode i odmah potražite liječničku pomoć. Kontakt s ostalim tkivima: područje na kojem je došlo do izljeva odmah isperite obilnim kolicinama vode nekoliko minuta.

⚡️ Korozivno

⚡️ **OGRAĐENJE**

TEMPERATURE: Čuvajte u hladnjaku (2-8°C)

JAMSTVO: Reliance Orthodontic Products, Inc. preuzima odgovornost za zamjenu proizvoda ako se dokaže da su neispravni. Reliance Orthodontic Products, Inc. ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, izravan ili posljedičan, koji proizilazi iz upotrebe ili nesposobnosti da se proizvod upotrebljava kako je opisano. Prije upotrebe, korisnik je dužan utvrditi prikladnost proizvoda za njegovu predviđenu namenu. Korisnik preuzima sav rizik i odgovornost u vezi s navedenim.

SAMO NA RX: Savezni zakon SAD-a ograničava kupovinu ovog proizvoda na stomatološke radnike ili po njihovom natologu.

OBAVIJEST: Svaki ozbiljni incident prijavite tvrtki Reliance i nadležnom tijelu države u kojoj korisnik i / ili pacijent ima sjedište.

HU - HUNGARIAN

ALKALMAZÁSI JAVALLATOK: A Precedent® ortodontiai gyűré cementként történő felhasználásra szögál.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

GYŰRŐ CEMENTÁLÁS:

1. Polírozza a fog felületét a First and Final módszerrel. Öblítse le

és szárítsa meg.

2. Mindegyik gyűrű esetén adagoljon 2 színtezőkanálnyit Preceden® port a keverőlapra.

3. Helyezzen 4 csepp Precedent® folyadékot a keverőlapra, a Precedent® por mellé.

4. Keverje össze a Precedent® port és a Precedent® folyadékot 15 másodpercig, vagy amíg a keverék egynemű és krémes nem lesz. Tegye az összekevert cementet a gyűré belsejére és helyezze fel a gyűrűt. Azonnal távolítsa el a felesleges kifolyó anyagot egy nedves vattatekerccsel. A keverés kezdetétől számított munkaidő 2,5 perc. 5 ½ perc elteltével az elszívórendszer és a szájtörpezet eltávolíthatók. Várjon további 5 percet a ligálás előtt

BRACKET BONDÓZÁS:

Ha nagy igénybevétel alatt álló területeken helyez fel gyűrűt vagy bondozó attachmenteket (a második örífőfog függőleges kiegyenesítése; impaktált színtefogak extrúziója), akkor polírozza a fogat a First and Final® készítménnyel. Szárazza a zománcot 30 másodpercig. Öblítse le és szárítsa meg. Vigyen fel 1 rétegű Assure® Plus-t, szárítsa legárammal és fotopolimerizálja. Keverje össze és alkalmazza a Precedent®-et a bracketre vagy a gombra, és helyezze a fogra. Nyomja a helyére és a kinyomódó anyagot tisztítsa le. Az aktív fogszabályozó iv felhelyezése előtt várjon 15 percet.

⚡️ **ÖVINTÉZKEDÉSEK:** A nem polimerizált gyanták az arra érzékeny személyeknél bőrirritációt okozhatnak. Bőrrel való érintkezés esetén alaposan mossa le szappannal és vízzel. Vételten szembe jutás esetén öblítse ki bő vízzel és azonnal forduljon orvoshoz. Egyéb szöveteikkel történő érintkezés: a szivárgással érintett területet azonnal, több perccig öblítse le bőséges mennyiségű vízzel.

⚡️ Korrozív

⚡️ **HÖMÉRSEKLETKORLÁTOZÁS:** Hűtve (2-8°C) tárolandó

GARANCIA: A Reliance Orthodontic Products, Inc. vállalja, hogy kicseréli a termékeket, amennyiben azok hibásnak bizonyulnak. A Reliance Orthodontic Products, Inc. nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy következményes kárért vagy veszteségért, amely a termékek feltiekben ismertetett felhasználásából vagy a fenti előírásoktól eltérő felhasználásából fakad. Használat előtt a felhasználó felelősségre annak meghatározása, hogy a termék alkalmas-e a rendeltetészerű felhasználásra. Ezzel kapcsolatban minden kockázatt és felelősség a felhasználót terhel. **KIZÁRÓLAG ORVOSI RENDELVÉNYRE:** Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi törvényei értelmében az eszköz kizárólag orvosi rendelőnyre vagy fogszakorvos részére értékesíthető.

FELSZÓLÍTÁS: Jelentsen minden súlyos eseményt a Reliance-nek és a felhasználó és/ vagy a páciens letételepési helyének megfelelő állami illetékes hatóságainak.

IT - ITALIAN

INDICAZIONI PER L'USO Precedent® è concepito per l'uso come cemento per bande ortodontiche.

ISTRUZIONI PER L'USO

CEMENTAZIONE DELLE BANCHE:

- Eseguire la profilassi della superficie del dente con First and Final. Risciacquare e asciugare.
- Per ogni banda, distribuire 2 misurini di Precedent® in polvere sulla tavoletta di miscelatura.
- Collocare 4 gocce di Precedent® liquido sulla tavoletta di miscelatura, accanto a Precedent® in polvere.
- Miscelare Precedent®in polvere e Precedent® liquido per 15 secondi o fino a quando la miscela sarà uniforme e cremosa. Posizionare il cemento miscelato all'interno della banda e posizionare la banda. Pulire immediatamente la sbavatura in eccesso con un rulli salivare in cotone bagnato. Il tempo di lavoro dall'inizio della miscelazione è di 2,5 minuti. Dopo 5 ½ minuti, il campo asciutto il retrattore della guancia possono essere rimossi. Attendere altri 5 minuti prima della legatura

INCOLLAGGIO SU BRACKET: In caso di bandaggio in aree ad alto stress o incollaggio di attacchi (radrizzamento di secondi molari; estrusione di cuspidi impattate),

eseguire la profilassi del dente con First e Final®. Mendorzare con acido lo smalto per 30 secondi. Risciacquare e asciugare. Applicare 1 strato di Assure® Plus, asciugare all'aria e fotopolimerizzare. Miscelare e applicare Precedent® al bracket o al bottone e posizionarlo sul dente. Premere in posizione e pulire eventuali sbavature. Attendere 15 minuti prima di posizionare un filo metallico attivo.

⚡️ **PRECAUZIONI:** Le resine non polimerizzate possono causare sensibilizzazione cutanea nelle persone predisposte. In caso di contatto con la pelle, lavare accuratamente con acqua e sapone. Se accidentalmente instillati negli occhi lavare abbondantemente con molta acqua e rivolgersi immediatamente a un medico. Contatto con altri tessuti: risciacquare immediatamente l'area di fuoriuscita con abbondanti quantità di acqua per vari minuti.

⚡️ Corrosivo

⚡️ **LIMITI DI TEMPERATURA:** Conservare in frigorifero (2-8°C)

GARANZIA: Reliance Orthodontic Products, Inc. si assume la responsabilità per la sostituzione dei prodotti qualora se ne dimostri la difettosità. Reliance Orthodontic Products, Inc. non si assume responsabilità per eventuali danni o perdite, diretti o conseguenti, derivanti dall'uso o dall'incapacità di usare i prodotti così come descritti. Prima dell'uso, e responsabilità dell'utilizzatore determinare l'adeguatezza del prodotto per l'uso previsto. L'utilizzatore si fa carico di tutti i rischi e della responsabilità legati all'uso.

SOLO SU PRESCRIZIONE MEDICA: STATI UNITI la legge federale degli Stati Uniti limita la vendita di questo dispositivo a odontoiatri o su prescrizione medica.

NOTA: segnalare qualsiasi incidente grave a Reliance e all'autorità competente dello Stato in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente.

NL - DUTCH

INDICATIES VOOR GEBRUIK: Precedent® is bedoeld voor gebruik als orthodontisch bandcement.

GEBRUIKSAANWIJZING:

BANDCEMENTEREN:

1. Reinig het tandoppervlak met First en Final. Spoel en droog.

2. Voor elke band worden 2 maatschepjes Precedent®-poeder of het mengpad aangebracht.

3. Plaats 4 druppels Precedent®-vloeistof op het pad, naast het Precedent®-poeder.

4. Meng het Precedent®-poeder en de Precedent®-vloeistof gedurende 15 seconden of tot het mengsel uniform en romig is. Plaats het mengende cement aan de binnenzijde van de band en breng de band aan. Verwijder het overtollige cement onmiddellijk met een nat katoenen rol. De werktijd vanaf het begin van het mengen bedraagt 2,5 minuten. Na 5 ½ minuut kunnen de droogdelen en wangretractoren worden verwijderd. Wacht nog 5 minuten voor de ligatie

BEUGELVERLIJMING:

Bij het banderollen in gebieden met een hoge belasting of bij het hechten (oprichten van tweede kiezen; extruderen van ingedrukte hoektanden), reinigt u de tand met First en Final®. Zuurets het glazuur gedurende 30 seconden. Spoel en droog. Breng 1 laagje Assure® Plus aan, droogblazen en lichtuitharden. Meng en breng Precedent® aan op de beugel of de knop en plaats deze op de tand. Druk op de juiste positie en verwijder overtollig cement. Wacht 15 minuten voordat u een actieve boogkabel plaatst.

⚡️ **LET OP:** Ongepolymeriseerde harsen kunnen bij gevoelige personen huidirritatie veroorzaken. In geval van contact met de huid grondig wassen met water en zeep. Als het net ongeluk in het oog komt, spoel dan overvloedig met water en zoek onmiddellijk medische hulp. Bij contact met andere weefsels; gedurende enkele minuten overvloedig spoelen.

⚡️ Corrosief

⚡️ **TEMPERATUURBEPERKING:** Koel bewaren (2-8°C)

GARANTIE: Reliance Orthodontic Products, Inc. erkent haar verantwoordelijkheid om producten te vervangen als blijkt dat ze defect zijn. Reliance Orthodontic Products, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies, direct of indirect,

die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de producten zoals beschreven. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik. De gebruiker neemt alle risico's en aansprakelijkheid in verband hiermee op zich.

ALLEEN RX: VS. De federale wetgeving beperkt dit apparaat tot de aankoop door of in opdracht van een tandarts.

OPMERKING: Ernstige incidenten moeten worden gemeld bij Reliance en de beoogde autoriteit van de staat waarin de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

NO - NORWEGIAN

INDIKASJONER FOR BRUK: Precedent® er tiltenkt for bruk som ortodontisk matrissemesset.

INSTRUKSJONER FOR BRUK:

MATRISEMENTERING:

1. Forbehandle tannoverflaten med First and Final. Skyll og tørk.

2. Dispsn 2 måleskjeer med Precedent®-pulver for hvert bånd på blandedeuten.

3. Ha 4 dråper Precedent®-væske på puten ved siden av Precedent®-pulveret.

4. Bland Precedent®-pulveret og Precedent®-væsken i 15 sekunder eller til blandingen er jevn og kremet. Plasser den blandede sementen på insiden av matrisen, og sett matrisen på plass. Fjern overflødig materiale øyeblikkelig med en våt bomullsrull. Arbeidstiden fra blandingen startes, er 2,5 minutter. Etter 5 ½ minutter kan det tørre feltet og kinnholderne fjernes. Vent i ytterligere 5 minutter før liggering

BRACKETBONDING:

Ved bonding i områder med høy belastning eller bondingsfester (vertikalt andre molar, ekstruderte påvirkede kuspider), må tannen beskyttes med First and Final®. Syreets emaljen i 30 sekunder. Skyll og tørk. Påfør et strøk Assure®Plus, tørk med luft og lysherd. Bland og appliser Precedent® på bracketen eller knappen, og plasser på tannen. Trykk på plass, og fjern overflødig materiale. Vent i 15 minutter før en aktiv buevæiar plasseres.

⚡️ **FORHOLDSREGLER:** Ikke-polymerisert resin kan forårsake hudirritasjoner hos mottakelige personer. Ved kontakt med huden, vask grundigt med såpe og vann. Ved utilsiktet kontakt med øyne, skyll med store mengder vann og kontakt lege øyeblikkelig. Ved kontakt med annet vev; skll med godkjente områder umiddelbart med store mengder vann i flere minutter.

⚡️ Etsende

⚡️ **TEMPERATURBEGRENSNING:**

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C)

GARANTI: Reliance Orthodontic Products, Inc. anerKjenner sitt ansvar for å erstatte produkter hvis de viser seg å være defekt. Reliance Orthodontic Products, Inc. påtar seg intet ansvar for skader eller tap, direkte eller følgeskader, som skyldes bruk av eller manglende evne til å bruke produktene som beskrevet. For bruk er det brukernes ansvar å vurdere egnetheten til produktet for den tiltenkte bruken. Bruken påtar seg all risiko og ansvar i forbindelse med dette.

BARE RX: Føderal lov i USA begrenser salg av denne enheten til eller etter ordre fra en tannlege.

MERKNAD: Rapportert alvorlige hendelser til Reliance og ansvarlig tilsynsmyndighet i landet der brukeren og/eller pasienten er hjemmehørende.

PL - POLISH

WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Precedent® jest przeznaczony do stosowania jako ortodontyczny cement do pierścieni.

INSTRUKCJA STOSOWANIA:

CEMENTOWANIE PIERSIENI:

1. Przygotować powierzchnię zęba za pomocą pumeksu 1st & Final. Spłukać i osuszyć.

2. Na podkładkę do mieszanja nanieść 2 równe miarki proszku Precedent® Powder na każdy pierścień.

3. Nanieść 4 krople płynu Precedent® Liquid na podkładkę obok proszku Precedent® Powder.

4. Mieszać proszek Precedent® Powder z płynem Precedent® Liquid przez 15 sekund lub do uzyskania jednorodnej, kremowej mieszaniny. Należy użyzarykany cement na

wewnętrzną stronę pierścienia i osadzić pierścień. Nadmiar materiału natychmiast usunąć moką bawełnianą rolką. Czas reakcji od momentu rozpoczęcia mieszanja wynosi 2,5 minuty. Po 5 ½ minutach można usunąć rozwiernaki policzoków i pole suzanie. Poczekać dodatkowe 5 minut przed związaniem.

⚡️ Corrosiwo

⚡️ **LIMITACJA DE TEMPERATURA:**

W przypadku zakamada pierścieni w miejscach silnie obciążanych lub klejania zaczepów (prostowanie drugich zębów trzonowych, ekstruzja zatrzymanych kłów), przygotować zap za pomocą pumeksu 1st & Final®. Szklivo wyciawiac kwasem przez 30 sekund. Spłukać i osuszyć. Należy i warstwe żywiczy Assure® Plus, osuszyć powietrzem i utwardzić światłem. Wymieszać i nalożyć cement Precedent® na zamek lub guzik i umieścić na zębie. Wcisnąć na miejsce i usunąć nadmiar cementu. Poczekać 15 minut przed umieszczeniem aktywnego luku.

⚡️ **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:** Żywicze niespolimeryzowane mogą wywoływać u osób wrażliwych uczulenie na skórze. W przypadku kontaktu ze skórą uprzytkoć dokładnie wodą z mydłem. W razie przypadkowego dostania się do oka przepłukać dużą ilością wody i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Kontakt z innymi tkankami: miejsce wycieku natychmiast przepłukać obficie wodą przez kilka minut.

⚡️ Produkt żrący

⚡️ **OGRANICZENIE TEMPERATURY:**

Przechowywać w lodówce (2–8°C).

GWARANCJA: Firma Reliance Orthodontic Products, Inc. odpowiada za wymianę produktów w przypadku stwierdzenia ich wadliwosci. Reliance Orthodontic Products, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty bezpośrednie lub wtórne wynikające z użycia lub braku możliwości użycia produktów w sposób zgodny z opisem. Przed użyciem użytkownik odpowiada za określenie przydatności produktu do przewidzianego zastosowania. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ryzyko z tym związane. **PRODUKT DOSTĘPNY TYLKO NA RECEPTĘ:** Amerykańskie prawo federalne ogranicza sprzedaż tego wyrobu przez lekarza dentystę lub na jego zlecenie.

UWAGA: Wszelkie poważne zdarzenia należy zgłaszać firmie Reliance oraz właściwemu organowi państwa, w którym użytkownik i/lub pacjent przebywa.

PT - PORTUGUESE

INDICAÇÕES DE USO: Precedent® destina-se ao uso como cimento de banda ortodôntica.

INSTRUÇÕES DE USO:

CIMENTAÇÃO DE BANDAS:

1. Faça a profilaxia da superfície dentária com First and Final. Enxágue e seque.

2. Para cada banda, distribua 2 colheres de nível de Precedent® Powder sobre o bloco de mistura.

3. Coloque 4 gotas de Precedent® Liquid sobre o bloco, ao lado do Precedent® Powder.

4. Misture o Precedent® Powder e o Precedent® Liquid durante 15 segundos ou até que a mistura seja uniforme e cremosa. Coloque o cimento misturado no interior da banda e assente a banda. Limpe imediatamente o excesso de flash com um rolo de algodão molhado. O tempo de trabalho desde o início da mistura é de 2,5 minutos. Após 5 ½ minutos, o campo seco e os retratores de bochechas podem ser removidos. Espere mais 5 minutos antes da ligação

COLAGEM DE BRÁQUETE:

Ao realizar a bandagem em áreas de alta tensão ou em acessórios de colagem (verticalização de segundos molares; extrusão de cúspides impactadas), faça a profilaxia do dente com First and Final®.

Condição e esmalte com ácido durante 30 segundos enxágue e seque. Aplique 1 camada de Assure® Plus; seque ao ar e faça a fotopolimerização. Misture e aplique Precedente® ao bráquete ou botão e coloque no dente. Pressione no lugar e limpe o flash. Espere 15 minutos antes de colocar um arco ativo.

⚡️ **PRECAUÇÕES:** As resinas não polimerizadas podem causar sensação cutânea em pessoas suscetíveis. Em caso de contato com a pele, lave bem água e sabão. Se acidentalmente instilados nos olhos, enxágue

com quantidade abundante de água e procure imediatamente assistência médica. Contato com outros tecidos: lave imediatamente a área de derramamento com quantidades abundantes de água durante alguns minutos.

⚡️ Corrosivo

⚡️ **LIMITAÇÃO DE TEMPERATURA:**

Armazene refrigerado (2-8°C)

GARANTIA: A Reliance Orthodontic Products, Inc. reconhece a sua responsabilidade em substituir os produtos em caso de compração de defeitos. A Reliance Orthodontic Products, Inc. não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas, diretos ou consequentes, decorrentes do uso ou incapacidade de uso dos produtos, conforme descrito. Antes de usar, é responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto ao seu uso pretendido. O usuário assume todos os riscos e responsabilidades em relação a isso.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO: A lei federal dos EUA restringe este dispositivo à venda por ou a pedido de um profissional odontológico.

AVISO: Relate qualquer incidente grave à Reliance e à autoridade competente do estado em que o usuário e/ou paciente estiver estabelecido.

RO - ROMANIAN

INDICATIILE DE UTILIZARE: Precedent® este utilizat ca ciment pentru inele ortodontice.

INSTRUCTIUNILE DE UTILIZARE:

CIMENTAREA INELULUI:

1. Profilati suprafata dintelui cu First and Final. Clătiți și uscați.

2. Pentru fiecare inel, dozați 2 linguri de pudră Precedent® pe plăcuța de mixare.

3. Plasați patru picături de lichid Precedent® pe tampon, lângă pudra Precedent®.

4. Amestecați pudra Precedent® și lichidul Precedent® timp de 15 secunde sau până când amestecul este uniform și cremos. Inelați cimentul amestecat pe interiorul inelului și așezați inelul în poziție. Curățați imediat materialul în exces cu un prosop de bumbac umez. Durata de lucru de la începutul mixării este de 2,5 minute. După 5,5 minute, câmpul și depărtătoarele bucale pot fi îndepărtate. Așteptați încă cinci minute înainte de legare.

LIPIREA BRACKETULUI:

atunci când aplicați inele în zone cu sarcină crescută sau fixați atașamente (extragerea celui de-al doilea molar, extrudarea cuspidelor afectate), profilați dintele cu First and Final®.

Gravați cu acid smaltul timp de 30 de secunde. Clătiți și uscați cu aer și fotopolimerizați. Amestecați și aplicați Precedent® pe bracket sau buton și așezați pe dinte. Apăsați în poziție și curățați materialul în exces. Așteptați 15 minute înainte de a plasa un arc activ.

⚡️ **PRECAUTII:** rășina nepolimerizată poate provoca sensibilizarea pielii la persoanele susceptibile. In caz de contact cu pielea, spălați-vă bine cu apă și săpun. Dacă produsul este introdus accidental în ochi, spălați cu cantități abundente de apă și solicitați imediat asistență medicală. Contactul cu alte țesuturi clătiți imediat zona cu cantități abundente de apă timp de câteva minute.

⚡️ Coroziv

⚡️ **LIMITE DE TEMPERATURĂ:** a se păstra la rece (2-8°C)

GARANTIE: Reliance Orthodontic Products, Inc. își recunoaste responsabilitatea de a înlocui produsele dacă se dovedesc a fi defecte. Reliance Orthodontic Products, Inc. nu își asumă răspunderea pentru daunele sau pierderile, directe sau pe cale de consecință, care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza produsele descrise. Înainte de utilizare, este responsabilitatea utilizatorului de a determina compatibilitatea produsului pentru utilizare prevăzută. Utilizatorul își asumă toate riscurile și răspunderea în această privință.

NUMAI CU PRESCRIPTIE PENTRU

UTILIZARE PROFESIONALĂ: legea federală din SUA restricționează vânzarea acestui dispozitiv de către sau la recomandarea unui specialist stomatolog.

INSTIINTARE: Raportați orice incident grav către Reliance și autoritatea competentă din statul în care utilizatorul și/sau pacientul își are domiciliul.

SV - SWEDISH

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING:

Precedent® är avsett att användas som en ortodontisk bandcement.

BRUKSANSVNING:

BANDCEMENTERING:

1. Polera tandytan med 1st & Final. Skölj och torka.

2. För varje band, fördela 2 strykta skopor med Precedent®-pulver på blandningsplattan.

3. Tillsätt 4 droppar Precedent® Liquid på plattan bredvid Precedent® Powder.

4. Blanda Precedent®-pulveret och Precedent®-våtskan i 15 sekunder eller tills blandingen är enhetlig och krämig. Placera blandat cement på insidan av bandet och placera bandet.

Torka genast bort överskott med en fuktig bomullsrulle. Arbetstiden från början av blandingen är 2,5 minuter. Efter 5 ½ minuter kan det torra fältet och kindretractorn tas bort. Vänta ytterligare 5 minuter innan liggering.

BONDING AV FÅSTEN:

När band ska sättas fast i områden som utsätts för stora påfrestningar eller vid bonding av bägfåsten (förljftning av molarer i position 2, extrudering av inklade kuspider), polera med 1st & Final®. Syraets emaljen i 30 sekunder. Skölj och torka. Applicera 1 lager av Assure® Plus, torka med luft och ljushärda. Blanda och applicera Precedent® på fästet eller knappen och sätt på tanden. Tryck på plats och torka bort överskott. Vänta 15 minuter innan du sätter ut en aktiv bägtråd.